



CHOQUE®

Reg. PQUA N° 1983 – SENASA

FORMULACIÓN

CHOQUE es un acaricida de formulado como suspensión concentrada que contiene 240 g de Spirodiclofen por un litro de producto formulado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHOQUE es un acaricida de contacto a base de Spirodiclofen Combate huevos, estados inmaduros y adultos, Por sus características, se adhiere rápidamente a la capa cerosa de la superficie foliar confiriéndole residualidad.

CHOQUE se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente. Use boquillas de con vacío para dar buena cobertura y garantizar que el producto llegue a la hojas, frutos y tallos.

MODO DE ACCIÓN

Spirodiclofen que interfiere en la biosíntesis de lípidos al bloquear la acetil coenzima A carboxilasa de acetil coenzima que regula la formación de ácidos grasos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Mandarina	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	-	0.6	7	0.04
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.05 - 0.1	-	14	2.0
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	-	0.6	2	1.0

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.



RECOMEDACIONES

- ✓ Acondicione el volumen de agua necesaria a un pH de 5.5 a 6.0.
- ✓ Realice una pre-mezcla en agua acondicionada.
- ✓ Utilice adherente.
- ✓ CHOQUE se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente.
- ✓ Use boquillas de con vacío para dar buena cobertura y garantizar que el producto llegue a la hojas, frutos y tallos.
- ✓ Cuide que el agitador del equipo pulverizador se encuentre funcionando, desde cuando vierte la mezcla hasta culminar la aplicación.
- ✓ Lave el equipo de aplicación sin contaminar las fuentes de agua.
- ✓ Aplicar en forma preventiva al ataque de las enfermedades, repitiendo el tratamiento de acuerdo con las condiciones medioambientales.
- ✓ El producto debe ser usado dos veces por campaña, el intervalo entre aplicaciones como mínimo debe ser 20 días. Cuando la presión de la plaga sea muy fuerte y requiera una aplicación antes de los 20 días, use otro acaricida de diferente modo de acción.

COMPATIBILIDAD

CHOQUE es incompatible con productos pH mayor a 9 o menor a 4.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

PERIODO DE REINGRESO

Deben transcurrir 24 horas para reingresar al campo tratado.

SEGURIDAD

- ✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- ✓ Es Ligeramente peligroso - cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color azul.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.